



**Dr. med. Michael Lauterwein**  
Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie

**Dr. med. Friedhelm Neuscheler**  
Facharzt für Allgemeinmedizin

Internistische Hausarztpraxis

Diabetologie

**Bahnhofstrasse 18**

**88069 Tettang**

**T 07542-8900**

**F 07542-54831**

[www.internist-tettang.de](http://www.internist-tettang.de)

Patientenname:

Impfung:

## Aufklärungsbogen Impfungen

### Angaben zur medizinischen Vorgeschichte -> Bitte Entsprechendes ankreuzen:

- |   |    |      |
|---|----|------|
| 1. Besteht derzeit eine akute fieberhafte Erkrankung?   | Ja | Nein |
| 2. Sind bei Ihnen Allergien (z.B. Hühnereiweiß) oder Medikamentenunverträglichkeiten bekannt?                                     | Ja | Nein |
| 3. Besteht eine Immunschwäche durch Erkrankung wie Blutkrebs, HIV-Infektion, Milzentfernung oder durch Medikamente z.B. Cortison? | Ja | Nein |
| 4. Besteht eine erhöhte Blutungsneigung (zum Beispiel durch Einnahme von Marcumar)?   | Ja | Nein |
| 5. Besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft oder wird derzeit noch gestillt?   | Ja | Nein |
| 6. Wurden Sie in den letzten vier Wochen gegen Gelbfieber, Masern, Röteln oder Windpocken geimpft?                                | Ja | Nein |

### Alle von uns empfohlenen Impfungen sind sehr gut verträglich und bieten eine hohe Wirksamkeit.

Aus rechtlichen Gründen müssen wir Sie dennoch über alle jemals aufgetretenen Nebenwirkungen aufklären:

- Jede Injektionsimpfung kann Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und Verhärtungen an der Injektionsstelle, lokale Lymphknotenschwellung, sowie in seltenen Fällen allergische Reaktionen wie Hautausschlag und Juckreiz, Herzkreislauf- und Atmungsstörungen hervorrufen
- In einzelnen Fällen kann die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigt sein (zum Beispiel bei Schwindel)

Hiermit erkläre ich, dass ich die Informationen verstanden und zur Kenntnis genommen habe. Es bestand ausreichend Gelegenheit Fragen zu stellen.

Tettang, den

Unterschrift der Patientin/ des Patienten

## Impfungen: Übersicht Nebenwirkungen und Kontraindikationen

### Gelbfieber (Stamaril®):

**Sehr häufig:** Kopfschmerz, Lokaireaktion. **Häufig:** grippeähnliche Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. **Gelegentlich:** Bauchschmerz. **Selten:** allergische Reaktionen. **Sehr selten:** Hirnhautentzündung, Guillain-Barré-Syndrom, Krämpfe, Leberversagen, Nierenversagen, Atemstillstand, in Einzelfällen mit Todesfolge.

**Gegenanzeigen:** Hühnereiweiß-Allergie, Kinder < 9 Monate, Schwangere und Stillende, fortschreitende bösartige Erkrankungen, Immunsuppression und Immundefekt, nach Chemo- und Strahlentherapie, Thymuserkrankung.

### Tollwut (Rabipur®, Tollwut-Impfstoff-HDC®):

**Sehr häufig:** Lokalreaktion, Übelkeit, Muskelschmerz. **Häufig:** Ausschlag, Fieber, Lymphknotenschwellung, Gelenkschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, grippeähnliche Beschwerden. **Selten:** Sehstörungen, Gefühlsstörungen. **Sehr selten:** allergische Reaktion, Erkrankungen des Nervensystems (Schwindel, Krampfanfall, Guillain-Barré-Syndrom).

**Gegenanzeigen:** Allergie gegen Neomycin oder Hühnereiweiß (Rabipur®).

### Hirnhautentzündung durch Meningokokken (Nimenrix®, Menveo®):

**Sehr häufig:** Lokalreaktion, Kopfschmerz, Übelkeit, Müdigkeit, Fieber. **Häufig:** Magen-Darm-Beschwerden, Schüttelfrost, Ausschlag. **Gelegentlich:** Schwindel, Muskelschmerzen, Gefühlsstörung. **Gegenanzeigen:** Schwangerschaft, frühere Unverträglichkeit, Überempfindlichkeit auf Diphtherietoxoid.

### Typhus (Typhim Vi®):

**Sehr häufig:** Lokalreaktionen, leichtes Fieber, grippeähnliche Beschwerden. **Selten:** Magen-Darm-Beschwerden. **Sehr selten:** allergische Reaktionen, Asthmaanfall.

### Japanische Enzephalitis (Ixlaro®):

**Sehr häufig/häufig:** Lokalreaktion, grippeähnliche Beschwerden, Fieber, Ausschlag, Übelkeit. **Gelegentlich:** Entzündung in Hals, Nase, Rachen, Migräne, Schwindel, Durchfall, Erbrechen, Bauchschmerz, Schüttelfrost, erhöhte Leberenzymwerte, Lymphknotenschwellung, Kurzatmigkeit, allergischer Hautausschlag. **Selten:** Juckreiz, Thrombozytopenie, Gefühlsstörungen, allergische Reaktion, Palpitationen, Herzrasen, periphere Ödeme.

### FSME (FSME-IMMUN® Erwachsene / -0,25ml Junior®):

**Häufig:** Lokalreaktion, Temperaturerhöhung, Kopfschmerz, Abgeschlagenheit, Krankheitsgefühl, Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Missemphindungen, Kribbeln, Gelenk- und Muskelschmerzen. **Gelegentlich:** Erbrechen. **Einzelfälle:** Schwindel, Nervenentzündung, Guillain-Barré-Syndrom, Meningismus, Enzephalitis, Krämpfe, Sehstörungen, Gangunsicherheit, Tachykardie, allergische Reaktion, Verstärkung von Autoimmunerkrankungen.

**Gegenanzeigen:** Allergie gg. Hühnereiweiß, Neomycin, Latex. Abzuwägen bei: Gehirnerkrankungen, Schwangeren/Stillenden.

### Tetanus, Diphtherie, Poliomyelitis und Keuchhusten (Boostrix Pollo®, Repevax®):

**Sehr häufig:** Lokalreaktion, Krankheitsgefühl, Müdigkeit, Reizbarkeit, Kopfschmerzen, Temperaturerhöhung, Ausschlag. **Häufig:** Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Gelenk- und Muskelschmerzen. **Gelegentlich:** Konjunktivitis, Atemwegsinfekt, Magen-Darm-Beschwerden. **Sehr selten:** Fieber  $\geq 39,9^{\circ}\text{C}$ . **Einzelfälle:** allergische Reaktionen, Atemnot, Krampfanfälle, neurologische Erkrankungen (Guillain-Barré, Neuritis), Schwindel.

### Pneumokokken (Pneumovax®, Prevenar 13®):

**Sehr häufig (Prevenar®):** verminderter Appetit, Fieber, Reizbarkeit, Schläfrigkeit/Schlafstörung. **Häufig:** Lokalreaktion. **Gelegentlich (Prevenar®):** Erbrechen, Durchfall. **Selten:** Fieber, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Kopf-, Muskel- und -Gelenkschmerzen, Lymphgefäßentzündung. (Prevenar®: Allergische Reaktion, Krampfanfälle). **Sehr selten:** Thrombozytopenie. **Einzelfälle (Pneumovax®):** Neuritis, Guillain-Barré-Syndrom, allergische Reaktionen, Schüttelfrost, Ödeme.

**Gegenanzeigen:** Schwangerschaft.

### Hepatitis B (Engerix B®) Hepatitis A (Havrix 1440®, HAVpur®) Hepatitis A und B (Twinrix®):

**Sehr häufig:** Kopfschmerz, Reizbarkeit. **Häufig:** Lokalreaktion, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit. **Gelegentlich:** Schwindel, Erbrechen, Muskelschmerzen, Fieber, Atemwegsinfekt. **Selten:** Abgeschlagenheit, erhöhte Temperatur, Frösteln, Kopf- und Gliederschmerzen, Gefühlsstörungen, Hautausschlag, niedriger Blutdruck. **Sehr selten:** Leberwerterhöhung, allergische Hautreaktionen. **Einzelfälle:** Thrombozytopenie, Neuritis/Enzephalitis/Meningitis, Lähmungen, Krampfanfälle, allergische Reaktionen, Vaskulitis, Leberwerterhöhung. **Gegenanzeigen:** Neomycin-Allergie.

### Cholera (Dukoral®):

**Gelegentlich:** Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerz. **Selten:** leichte Allgemeinerscheinungen, Fieber, Schwindel, Atemwegsbeschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit. **Sehr selten:** Dehydratation, Schläfrigkeit, Ohnmacht, Geschmacksstörung, Schwitzen, Ausschlag, Gelenkschmerzen, Frösteln. **Einzelfälle:** Gefühlsstörungen, allergische Reaktion, Asthenie, hoher Blutdruck. **Gegenanzeigen:** akute Magen-Darm-Erkrankungen. 1 Stunde vor und nach Impfung nicht essen und trinken.

### Masern-Mumps-Röteln (MMRVaxPro®):

**Häufig:** Ausschlag, Lokalreaktion, Fieber. **Gelegentlich:** Atemwegsinfekt, virale Infekte, Schnupfen, Erbrechen, Durchfall, Urtikaria. **Einzelfälle:** atypische Masern, Meningitis, Enzephalitis, Krampfanfälle, subakute sklerosierende Panenzephalitis, Epididymitis, Orchitis, Mittelohrentzündung, Parotitis, Thrombozytopenie, allergische Reaktion, Ödeme, Reizbarkeit, Ataxie, Benommenheit, Guillain-Barré-Syndrom, Augenmuskellähmung, Neuritiden, Polyneuropathie, Retrobulbärneuritis, Synkopen, Augen/Netzhautentzündung, Taubheit, Bronchospasmus, Lungenentzündung, Husten, Halsschmerz, Panniculitis, Pruritus, Arthritis, Gliederchmerzen, Vaskulitis. **Gegenanzeigen:** akute behandlungsbedürftige Erkrankungen, Immunschwäche, Schwangerschaft (und 3 Monate davor), Neomycin-Allergie, Fructose-Intoleranz. Alter < 9 Monate.

(Sehr häufig: > 10%. Häufig: 1%-10%. Gelegentlich: 0,1% bis 1%. Selten: 0,1% bis 0,01%. Sehr selten: < 0,01%)